

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Kínai tűzhasú gőte**  
*Cynops orientalis*

**Élőhely:** Közép- és Kelet-kínai tavacsókák, rizsföldek.

**Életmód:** Szeret a vízinövények közt rejtőzni. Szárazon is ügyesen mozog, az üvegfalán is felmászik (terráriumát gondosan zárni!). 20 évig is élhet.

**Szaporodás:** 10-200 petéjét a nőstény vízinövények leveleire rakja. Kikelés 2-3 hét, átalakulás lárvaállapotból 2-3 hónap után.

**Érdekesség:** Ivari dimorfizmus: a hím kisebb, vékonyabb, kloakája nagyobb.

**Takarmányozás:** Élő vagy fagyasztott, esetleg szárított szúnyoglárva, tubifex, kisebb rovarok.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Vörösfülű ékszerteknős**  
*Trachemys scripta elegans*

**Élőhely:** Észak-Amerika déli része, főleg floridai tavak, csatornák és mocsarak.

**Életmód:** Megriadva a vízbe veti magát, s ott keres menedéket. Akár 25 cm-esre is megnőhet. 25 évig vagy akár még tovább is élhet.

**Szaporodás:** Lágyhéjú tojásaiból akár százat is rakhat.

**Érdekesség:** Ivari dimorfizmus: a hím mellső végtagjain hosszú karmok vannak, mellyel a nőstény előtt „legyezve” udvarol.

**Takarmányozás:** Ragadozó: halat, marhaszívet kap, néha salátalevelet, békalencsét, csigákat is.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Sárgafülű ékszerteknős**  
*Trachemys scripta scripta*

**Élőhely:** Elterjedési területe sokkal kisebb, mint a vörösfülű ékszerteknősé: Virginia állam dél-keleti részétől Florida északi részéig őshonos.

**Érdekesség:** Ugyanannak a fajnak másik alfaja, mint a vörösfülű ékszerteknős, de attól valamivel kisebbre nő, hátpáncélja kicsit domborúbb, haspajzsa pedig alig mintázott. Legfőbb különbség a szem mögötti folt színében van. A Magyarországon szabadon engedett példányok komolyan veszélyeztetik egyetlen őshonos teknősfajunk, a mocsári teknős állományát.

**Takarmányozás:** Lásd a vörösfülű ékszerteknősnél!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Tarajosteknős**  
*Graptemys pseudogeographica*

**Élőhely:** Az USA területének középső harmada.

**Életmód:** Hasonló az ékszerteknősökéhez.

**Szaporodás:** Lágyhéjú tojásaiból csupán 6-8-at rak egy fészekaljba.

**Érdekesség:** A fiatalok háta „térképrajzolatú”, később szürkés. Hátpáncéljuk gerincvonalán tarajos él fut, a hátsó szélén pedig a lemezek cakkosan helyezkednek el. A fejtető mintázata miatt királyteknősnek is nevezik.

**Takarmányozás:** Az ékszerteknősökéhez hasonló, de több növényi eleséget kaphat.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Görög teknős**  
*Testudo hermanni*

**Élőhely:** Dél-Európa ligetes erdei, gyümölcsösei, Kelet-Spanyolországtól a Balkán-félszigetig.

**Életmód:** Magányosan élő állat. Akár 30 évet is megélhet.

**Szaporodás:** 5-30 db diónyi, fehér, meszes héjú tojást rak a laza talajba, melyek 2-3 hónap múlva kelnek ki.

**Érdekesség:** Október végétől áprilisig, 2-3 hetes koplalás után, 4-8 °C-os helyen, száraz avar között telettethető. Védett állatfaj!

**Takarmányozás:** Leveleket, érett gyümölcsöket, kevés zöldséget eszik. Mindig legyen tiszta ivóvize!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Kanári**  
*Serinus canaria*

**Élőhely:** Őshazája Madeira, az Azori- és a Kanári-szigetek fás területei.

**Életmód:** A hím szép énekével udvarol. 10 évig élhet.

**Szaporodás:** A kosárába tojt 4-5 halványkék tojás kelési ideje 14 nap, a fiókák két hét múlva repülnek ki.

**Érdekesség:** A vad alak zöldes, tenyészetekben különféle színű, énekű és alakú változatai ismertek. Tollazatuk színezete függ a kapott tápláléktól is.

**Takarmányozás:** Kanári magkeverék, gyümölcsök, reszelt sárgarépa-alapú lágyeleség (főtt tojással, kalciummal, csíráztatott magokkal), lisztkekac.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Japán sirályka**  
*Lonchura striata dom.*

**Élőhely:** Szabadon sehol sem él.

**Életmód:** Társaságkedvelő. Átlagos élettartama 5 év.

**Szaporodás:** A 4-6 tojásból álló fészekaljon a pár felváltva ül, a fiókák 12-13 nap múlva kelnek ki, három hetesen repülnek ki. Más pintyekfélék tojásait is kiköltik, s a fiókákat felnevelik (ideális dajkamadar).

**Érdekesség:** Valószínűleg az Indiában őshonos csikoshátú bronzpinty alfajaiból tenyésztették ki Kínában, majd Japánon át került Európába.

**Takarmányozás:** Pinty magkeverék, lágyeleség, fűrtös köles, füvek, tyúkhúr. Vízét naponta cseréljük!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Zebrapinty**  
*Taeniopygia guttata*

**Élőhely:** Ausztrália füves területei.

**Életmód:** Eleven, kissé erőszakos madárka. Esténként párjával, vagy többedmagával, egy fészekben alszik. Szeret vizébe belefürdeni. (Napi vízcsere!) 5 évig él.

**Szaporodás:** Az elől félig nyitott fészekodút tollakkal, fűszálakkal, papírdarabkákkal béleli ki. A 4-8 tojáson a pár felváltva ül, s a fiókák 12-13 nap alatt kelnek ki. Három hét múlva repülösek.

**Érdekesség:** A hím csőre élénkebb piros, mint a nőstényé, s narancsos pofafoltja van.

**Takarmányozás:** Lásd a japán sirálykánál!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Hullámos papagáj**  
*Melopsittacus undulatus*

**Élőhely:** Ausztrália belső, száraz területein él.

**Életmód:** Csoportban érzi igazán jól magát. Békés állat. Élettartama 7 év.

**Szaporodás:** A pár 18 nap alatt költi ki a 3-6 tojásból álló fészekaljait. A kirepülés a 30-35. napon történik.

**Érdekesség:** A vad típus zöld. Tenyésztésváltozatai sokféle színben előfordulnak. A csőr fölötti viaszhártya a nőstényeknél barna, a hímeknél kék.

**Takarmányozás:** Hullámos papagáj magkeverék, gyümölcsök, zöldségek, hajtások, főtt tojás, túró, lisztkukac. Csőrkoptatónak szépia, mész. Friss ivóvíz!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Nimfapapagáj**  
*Nymphicus hollandicus*

**Élőhely:** Ausztrália belső területei, nyugati partvidéke, továbbá Tasmánia.

**Életmód:** A párok nagy csapatokban is összetartanak. Békés madár. 18 évig él.

**Szaporodás:** 4-5 tojásból álló fészekaljait 18-20 nap alatt költi ki a pár. A kirepülés 4-5 hetesen történik.

**Érdekesség:** A kakaduk közeli rokona. Homlokán lévő csúcsánál elkeskenyedő bóbitáját izgatottságában, vagy udvarlás közben felmereszti.

**Takarmányozás:** Nagypapagáj magkeverék és a hullámos papagájnál leírt kiegészítők. Napi vízcsere!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Stanley papagáj**  
*Platycercus icterotis*

**Élőhely:** Délnyugat-Ausztráliában él. Nyílt erdőségekben, és megművelt területeken is előfordul (utóbbi helyeken károkat okoz), kedveli a víz közelségét.

**Életmód:** Párban vagy kisebb csapatokban él. Jámbor, bizalmas természetű madár. 15 évig élhet.

**Szaporodás:** Élőhelyén eukaliptuszfák üregeiben költ. Fészekalja 3-8 tojásból áll, a kotlási idő 3 hét, a fiókák 1 hónaposan repülnek ki.

**Érdekesség:** Nevét az ismert Afrika-kutatóról kapta.

**Takarmányozás:** Nagypapagáj magkeverék sok zölddel, rovarokkal kiegészítve. Naponta friss ivóvíz!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Kis Sándor-papagáj**  
*Psittacula krameri*

**Élőhely:** Észak-Afrikától Indiáig elterjedt.

**Életmód:** A párok csapatokon belül élnek, a szaporodási időszakon kívül a tojó a domináns fél. Hamar szelídül. 15 évet élhet meg.

**Szaporodás:** A 2-5 tojásból álló fészekalj kelési ideje 24 nap, a fiókák 40-50 nap múlva hagyják el a fészket.

**Érdekesség:** A hímek nyaki gyűrűmintája miatt örvös papagájnak is nevezik. Állítólag Nagy Sándor hozta Európába díszmadárnak ezt a fajt.

**Takarmányozás:** Nagypapagáj magkeverék kiegészítve zöldséggel, gyümölccsel. Naponta friss víz!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Szíriai aranyhörcsög**  
*Mesocricetus auratus*

**Élőhely:** Eredetileg Palesztina sivatagos területein élt, ma már lényegében csak szobaállatként ismert.

**Életmód:** Éjjel aktív. Magányosan él.

**Szaporodás:** Szaporodási rekorder: vemhességi ideje csupán 16 nap, s a fiatalok már 6 hetesen ivarérettek. Élettartama rövid: 1-3 év.

**Érdekesség:** Táplálékát, de néha kölykeit is, pofazacskójába tömve szállítja.

**Takarmányozás:** A többi rágcsálóhoz hasonlóan gyümölcsök, zöldségek, magvak, kiegészítve szénával és állati eredetű fehérjével (pl.: rovarok, túró).

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Mongol futóegér**  
*Meriones unguiculatus*

**Élőhely:** A Bajkál-tótól délre, elsősorban Mongólia pusztáin, sivatagos területein él.

**Életmód:** Kolóniákban él, föld alatti járatokat készít. Élettartama 4-6 év.

**Szaporodás:** 21-22 napos vemhesség után 3-5 csupasz, zárt szemrésű kölyök jön a világra. Szoptatási idő három hét.

**Érdekesség:** Nem szabad farkánál fogva felemelni, mert az ezt borító vékony bőr könnyen megsérül!

**Takarmányozás:** A többi rágcsálóhoz hasonlóan gyümölcsök, zöldségek, magvak, széna.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Degu**  
*Octodon degus*

**Élőhely:** Chile, ahol a síkvidékek bozótos területeitől a hegyvidékekig gyakori. A szántóföldeken kártevő.

**Életmód:** Nagy csapatokban él. Nappal aktív. Hamar szelídül, igen intelligens. Élettartama 4-6 év.

**Szaporodás:** 82-86 napi vemhesség után 2-8 igen fejlett kölyök születik, melyek kezdettől fogva szilárd táplálékot is fogyasztanak.

**Érdekesség:** Nem szabad farkánál fogva felemelni, mert az ezt borító vékony bőr könnyen megsérül!

**Takarmányozás:** Mint a többi rágcsáló: gyümölcsök, zöldségek, magvak, széna.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Tengerimalac**  
*Cavia porcellus*

**Élőhely:** Eredetileg Dél-Amerika, de házasított formája ma már világszerte házikedvenc.

**Életmód:** Nappal aktív. Jámbor, bár kissé ijedős. 7-8 éves kort élhet meg.

**Szaporodás:** Az anya 65-68 napi vemhesség után hoz világra általában 1-4 szőrös, igen fejlett kölyköt.

**Érdekesség:** Sokféle tenyészfajtája létezik: simaszőrű, rozettás, hosszú szőrű, angóra stb.

**Takarmányozás:** A többi rágcsálóhoz hasonlóan gyümölcsök, zöldségek kiegészítve magvakkal, szénával.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Törpenyúl**  
*Oryctolagus cuniculus*

**Élőhely:** Az egész Európában elterjedt üregi nyúlból domesztikált házi nyúl egyik fajtája.

**Életmód:** Gyorsan szelídül, a nevére is hallgat, szobatisztaságra szoktatható. Maximális élettartama 12 év.

**Szaporodás:** 30 napos vemhesség után 2-5 utódot hoz világra. A szoptatási idő 4-6 hét.

**Érdekesség:** Testtömegük csupán 1 kg körüli. Kedvelt az angóra, az oroszlánfejű és a lógófülű változata is.

**Takarmányozás:** Fonnyasztott fűfélék, lucerna, széna kiegészítve zöldségekkel, gyümölcsökkel, szemes-takarmánnyal. Mindig legyen tiszta ivóvize!

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Achátcsiga**  
*Achatina fulica*

**Élőhely:** Afrika trópusi vidékei.

**Életmód:** Főleg éjjel aktív. Akár 10 évig is élhet.

**Szaporodás:** Az akár több hónapos nyugalmi állapotból a hőmérséklet és a környezet nedvességtartamának emelkedésére felébredő állat feltöri a házat bezáró mészfedőt, s megkezdődik a párzás és kölcsönös megtermékenyítés. A 30-90 db petéből, 14-18 nap alatt kelnek ki a kezdetben még szinte áttetsző kis csigák.

**Érdekesség:** Kúpos háza 13 cm hosszúságúra is megnő.

**Takarmányozás:** Zöldség, gyümölcs, mézspótlásra kalciumfoszfát, szépia vagy porrá tört tojásból adható.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Szivárványos guppi**  
*Lebistes reticulata*

**Élőhely:** Dél-Amerika északkeleti része.

**Életmód:** Társas, mozgékony hal, mely az akvárium minden szintjét belakja.

**Szaporodás:** Elevenszülő. A megtermékenyítés belső, a peték már a nőstény testében kikelnek. Az ivadékok már a fialás előtt láthatóvá válnak az anya hasfalán keresztül.

**Érdekesség:** Rengeteg szín- és farokúszóalakváltozatban tenyésztik. A nőstény jóval természetesebb, de kevésbé színpompás.

**Takarmányozás:** Mindenféle jó minőségű haleleség.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



**Mexikói kardfarkú hal**  
*Xiphophorus* hibrid

**Élőhely:** Mexikó déli része.

**Életmód:** Társas faj, az akvárium minden szintjét belakja.

**Szaporodás:** Elevenszülő. 4-5 hetenként nagyszámú (a törzsalak akár 200-250) ivadékot szül, de azokra a felnőttek kannibalizmusuk miatt veszélyt jelentenek.

**Érdekesség:** A törzsalak (*X. helleri*) zöld, de kedveltebb a vörös tenyésztésű változata. Nevét a hím farokúszójának alsó megnyúlt szegélyéről kapta. A nőstények képesek hímmé átalakulni.

**Takarmányozás:** Mindenféle jó minőségű haleleség.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



### **Black Mollie**

*Poecilia hibrid*

**Élőhely:** Vadon nem él, több faj keresztezéseként hozták létre a XX. század elején az USA-ban.

**Életmód:** Társas állat, a vízoszlop minden szintjét belakja. Melegigényes (25-28 °C), érzékeny a víz hőmérséklet változására!

**Szaporodás:** Elevenszülő. Általában nem szabályos időközönként szül, gyakori az 1-2 hetes túlfordás.

**Érdekesség:** A bársonyos fekete alapváltozaton kívül van albinó, vörös farkú, fekete-fehér tarka színű és lírafarkú alakja is.

**Takarmányozás:** Mindenféle jó minőségű haleleség.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



### **Vörös gabonasikló**

*Elaphe guttata*

**Élőhely:** Az USA középső részétől Északkelet - Mexikóig. Erdők, mocsarak, vasútvonalak, lakott területek, gabonaraktarak (innen a neve) környéke.

**Életmód:** Rejtett életmódú. Főleg éjjel aktív. Béketűrő természetű. Az elért élettartam rekord közel 22 év volt.

**Szaporodás:** Fészekalja 6-30 lágyhéjú tojásból áll, melyek 25-30 °C-on 70-90 nap alatt kelnek ki.

**Érdekesség:** Átlagosan 1-1,2 m hosszú. Többféle színváltozata ismert (albinó, részlegesen albinó, fekete). Zsákmányát szorítással öli meg.

**Takarmányozás:** Kisemlősök (főleg egerek).

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



### **Dzungáriai törpehörcsög** (*Phodopus sungorus*)

**Élőhely:** Közép-Ázsia pusztái, sztyeppéi, felsivatagjai.

**Életmód:** Az emberrel szemben – főleg kezdetben - bizalmatlan, gyakran harapós. A párokat általában jól együtt lehet tartani. Élettartama alig 2 év.

**Szaporodás:** Vemhességi ideje 20-22 nap. Egy alom 1-6 kölyökből áll, a kicsik gyorsan fejlődnek és 18-23 napon már ivaréretté válnak. Igen szapora, a nőstény már a fialás másnapján ismét vemhes lehet.

**Érdekesség:** Élőhelyén téli álmat alszik.

**Takarmányozás:** Az aranyhörcsöghöz hasonló, de több állati eredetű fehérjét igényel.

## AVASI GIMNÁZIUM ÁLLATHÁZA



### **Zebrawater sünegér**

*Amatitlania nigrofasciata*

**Élőhely:** Közép-Amerika, Guatemala kristálytisza vizeiben él, akváriumában is az ilyen vizet szereti.

**Életmód:** 22-23 C°-os vízzel is megelégszik, társas akváriumában is tartható.

**Szaporodás:** A néhány fokkal megemelt hőmérsékletű vízben lapos kövekre könnyen leikrázik. Az ikrákat a nőstény gondozza, melyek 52-54 óra alatt kelnek ki.

**Érdekesség:** Kezdő akvaristák kedvelt sügérfaja. Nagy termete és állandó „rendezkedése” miatt kevés növény marad meg mellette.

**Takarmányozás:** Igénytelen, kedvence az élő eleség.



**Törpe karmosbéka**  
*Hymenochirus curtipes*

**Élőhely:** Afrika napsütötte, sekély, iszapos vizei.

**Életmód:** 24-26 C°-os, dús növényzetű vizet igényel.

**Szaporodás:** A hím halk, percegő hívóhangjára „kézállásban” lejtik el násztáncukat. A peték két nap alatt kelnek ki, a lárvák a hatodik napon úsznak el, s 60-70 napig fejlődnek. Kifejletten 3-4 cm nagyságúak.

**Érdekesség:** Kimondottan vízi állat, a vizet szinte sohasem hagyja el. Nincs szemhéja, nyelve és szarufogai is hiányoznak. Táplálékát lába segítségével igazítja szájába. Levedlett bőrét is megeszi.

**Takarmányozás:** Tubifex, szúnyoglárva, haleleség.